

بيدوفيليا

اضطراب جنسي يتسبب في

«اشتهاء» الشخص جنسياً للأطفال

الأطفال الرضع



تشمل معظم الحالات الرجال البالغين المهووسين جنسياً بـ:

الفتيان / الفتيات

13

سنة وما دون

يمكن أن يكون المعتدي متزوجاً ولديه أطفال

لا يقتصر على الرجال، بل إن بعض النساء أيضاً يعتدين جنسياً على الأطفال (إلا أنه أقل شيوعاً وفقاً لبعض الأبحاث)

أعراض

استعمال القوة أو الإكراه أو الترغيب للانخراط مع الأطفال جنسياً

التحديق بجسد الأطفال وملامسة الأعضاء التناسلية

تحفيز جنسي عند رؤية الأطفال

تخييلات جنسية مرضية (fantasies) بصور أو مقاطع فيديو أو مواد إباحية للأطفال

يمكن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أن يتسببا أحياناً في الوفاة

الجاني الضحية



قد يكون متأثراً بتجربة تعرّضه للتحرش والاعتداء الجنسي أثناء الطفولة

من المفترض معالجته نفسياً على المدى الطويل، وبالأدوية

التي تغيّر الدافع الجنسي وتقلل من مستويات هرمون التستوستيرون

بعض سبب الوقاية



التربية الجنسية وفق المرحلة العمرية بدءاً من الطفولة المبكرة



مراقبة استخدام الأطفال للإنترنت ومتابعة أنشطتهم على الشبكة



على الآباء الامتناع عن مشاركة صور أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي